

## Кальций Сандоз® Форте. Потому что лучше усваивается<sup>1</sup>!



### Краткая инструкция по медицинскому применению препарата «Кальций Сандоз® Форте»

**Группировочное название:** кальция карбонат + кальция лактоглюконат.

**Лекарственная форма:** таблетки шипучие.

**Фармакотерапевтическая группа:** кальциево-фосфорного обмена регулятор.

**Показания к применению:** остеопороз различного генеза (постменопаузальный, сенильный, обусловленный длительной терапией глюкокортикоидами, иммобилизацией, гастрэктомией т.д.) в составе комбинированной терапии (например, с витамином D3 и бисфосфонатами); состояния, сопровождающиеся повышенной потребностью в кальции, в т. ч. беременность, период лактации, период интенсивного роста у детей; профилактика остеопороза; остеомаляция (в качестве дополнения к основной терапии в т.ч. с витамином D3); тетания латентного течения, сопровождающаяся гипокальциемией (для лечения острой тетании следует применять инъекционный раствор кальция); аллергические реакции (поддерживающая терапия).

**Противопоказания:** повышенная чувствительность к компонентам препарата, повышенная концентрация кальция в крови и моче (гиперкальциемия, гиперкальциурия), хроническая почечная недостаточность, нефроуролитиаз, нефроказиноз, фенилкетонурия и дефицит сахарозы/изомальтозы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция. Препарат Кальций Сандоз® Форте не рекомендуется для применения у детей в возрасте до 3-х лет в связи с отсутствием данных по эффективности и безопасности в данной категории.

<sup>1</sup> По сравнению с таблетированными формами карбоната кальция. Журнал «Врач». 2013. №7, С.18-24.



## Кальций Сандоз® Форте. Потому что лучше усваивается<sup>1</sup>!

**Применение при беременности и в период грудного вскармливания:** препарат может назначаться в период беременности и грудного вскармливания по рекомендации врача. Кальций проникает в грудное молоко. В период беременности суточная доза кальция не должна превышать 1500 мг. Гиперкальциемия в период беременности может вызвать дефекты физического и умственного развития у плода.

**Способ применения и дозы:** внутрь. Перед приемом таблетку растворяют в стакане воды. Таблетки шипучие препарата Кальций Сандоз® Форте предпочтительно принимать во время еды или сразу же после легкого приема пищи. Детям от 3 до 9 лет: 500 мг в сутки. Взрослым и детям с 10 лет: 1000 мг в сутки. В тяжелых случаях или при повышенной потребности в кальции (например, при лечении бисфосфонатами) возможно повышение дозы до 2000 мг в сутки.

**Побочные эффекты:** очень редко (<1/10,000): реакции повышенной чувствительности, в т.ч. сыпь, зуд, крапивница, гиперкальциемия. В единичных случаях сообщалось о системных аллергических реакциях анафилактических реакциях, отеках лица, ангионевротических отеках). В отдельных медицинских публикациях сообщалось о развитии гиперкальциурии на фоне приема кальциевых добавок. Редко (>1/10,000,<1/1,000): метеоризм, запор, диарея, тошнота, рвота, эпигастральная боль. При приеме в высоких дозах (2000 мг/сут при ежедневном приеме в течение нескольких месяцев) может наблюдаться головная боль, повышенная утомляемость, жажда, полиурия.

**Особые указания:** у пациентов с нарушениями функции почек прием солей кальция должен проводиться под медицинским наблюдением.

**Условия хранения:** при температуре не выше 30°C в плотно закрытом пенале. Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности:** 3 года.

<sup>1</sup> По сравнению с таблетированными формами карбоната кальция. Журнал «Врач». 2013. №7, С.18-24.